

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Panalene® Duo Forte **Adapalene 0.3% / Peróxido de Benzoilo 2.5%**

Venta Bajo Receta

Gel Dérmico

Industria Argentina

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Panalene® Duo Forte gel es para usar solamente sobre la piel (en forma tópica). No utilice Panalene® Duo Forte gel en o sobre su boca, ojos o vagina.

¿Qué es Panalene® Duo Forte gel?

Panalene® Duo Forte gel es un medicamento que se vende bajo prescripción médica para usar sobre la piel (en forma tópica) para tratar el acné vulgaris.

Se desconoce si **Panalene® Duo Forte gel** es seguro y efectivo en niños menores de 12 años de edad.

Antes de usar Panalene® Duo Forte gel, hable con su médico acerca de su condición médica, incluyendo si Ud.:

- Tiene otros problemas cutáneos, incluyendo cortes o quemaduras solares.
- Si Ud. está embarazada o planifica quedar embarazada. Se desconoce si **Panalene® Duo Forte gel** puede dañar a su hijo por nacer. Hable con su médico si Ud. está embarazada o planifica quedar embarazada.
- Si Ud. está amamantando o planifica amamantar. Se desconoce si **Panalene® Duo Forte gel** pasa a la leche materna y si puede dañar a su bebé. Hable con su médico si es aconsejable amamantar a su bebé si Ud. está usando **Panalene® Duo Forte gel**.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo los medicamentos bajo prescripción médica y aquellos de venta libre, vitaminas y suplementos fitoterápicos. Usar otros medicamentos tópicos contra el acné puede aumentar la irritación de la piel cuando se utilice **Panalene® Duo Forte gel**.

¿Cómo debo usar Panalene® Duo Forte gel?

- Evite la exposición a la luz solar o a lámparas solares, tales como camas solares. **Panalene® Duo Forte gel** puede hacer que su piel sea más sensible al sol y a la luz procedente de camas o lámparas solares. Use pantalla solar y use sombrero y ropa que cubra las áreas tratadas con **Panalene® Duo Forte gel** si Ud. tiene que exponerse al sol.
- El clima frío y el viento puede irritar la piel tratada con **Panalene® Duo Forte gel**.
- Evite aplicar **Panalene® Duo Forte gel** sobre áreas con cortes, abrasiones o piel quemada por el sol.

Formato H: 110 x 230 mm - Plegado vertical: no corresponde - Plegado horizontal: 7 x 30 mm + 1 x 20 mm - Encabezado a la vista

- Evite usar productos que sequen la piel, y productos que contengan altos niveles de alcohol, especias o sustancias abrasivas.
- Evite el uso de la depilación con cera como método de remoción de vello en la piel tratada con **Panalene® Duo Forte gel**.
- **Panalene® Duo Forte gel** puede decolorar su ropa o su pelo. Deje que **Panalene® Duo Forte gel** se seque completamente antes de vestirse para evitar que su ropa se decolore.

¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Panalene® Duo Forte gel?

Panalene® Duo Forte gel puede provocar serios efectos adversos que incluyen:

Reacciones cutáneas locales. Es más probable que las reacciones cutáneas locales se produzcan durante las primeras 4 semanas de tratamiento y habitualmente disminuyen con el uso continuo de **Panalene® Duo Forte gel**. Los síntomas y signos de reacciones cutáneas locales incluyen enrojecimiento, descamación, sequedad, aguijoneo o quemazón.

Informe inmediatamente a su médico si estos efectos adversos continúan por más de 4 semanas o empeoran, Ud. debe dejar de utilizar **Panalene® Duo Forte gel**.

¿Cómo debo conservar Panalene Duo® Forte gel?

Conservar **Panalene® Duo Forte gel** a temperatura ambiente menor a 30°C. No refrigerar.

¿Cuáles son las sustancias que componen Panalene® Duo Forte gel?

Principios activos: adapalene y peróxido de benzoílo.

Excipientes: acrilamida/ copolímero acrilóildimetiltaurato sódico + Isohexadecano + Polisorbato 80, dioctil sulfosuccinato sódico, glicerina, EDTA disódico, poloxamer 124, propilenglicol, agua purificada.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Mantenga **Panalene® Duo Forte** y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Presentaciones:

Pomos conteniendo 30 g.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 55.306
Directora Técnica: M. Gabriela Palma, Farmacéutica.



Laboratorios **PANALAB S.A. ARGENTINA**
Famatina 3415 (C14371OK) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires 0800-222-2666
www.panalab.com.ar

© 2018

0476-1 MA001377-4