### Ingredientes

water (aqua), disodium laureth sulfosuccinate, sodium laureth sulfate, peg-150 distearate, peg-7 glyceryl cocoate, peg-150 pentaerythrityl tetrastearate & peg-6 caprylic/capric glycerides & water, cocamidopropyl betaine, cocamide dea, salicylic acid, ictasol, water & ethanol & phenoxyethanol & peg-40 hydrogenated castor oil & chlorphenesin & phenyl salicylate & farnesol & chloroxylenol & dibromohexamidine isethionate & polyaminopropyl biguanide, laureth-9, fragrance (allergens: limonene, linalool), sodium hydroxide, polyquaternium 10, disodium edta.









# SHAMPOO Cuero cabelludo

Ácido Salicílico 2% - Ictiol1% Polidocanol 0,5%







## PANALAB S.A. ARGENTINA

Famatina 3415 CABA www.panalab.com N° leg.: 6998. Elaborado por Leg. № 129 Res. 155/98. Industria Argentina. Ayuda a remover las escamas de la piel del cuero cabelludo

# **Dermotrat**®

# SHAMPOO Cuero cabelludo

Ácido Salicílico 2% - Ictiol1% Polidocanol 0.5%



**Dermotrat®** es un shampoo con Ácido Salicílico. Ayuda a remover las escamas de la piel del cuero cabelludo

Formulado con **Ácido Salicílico** al 2%. Tiene acción queratolítica. Actúa como un exfoliante suave que limpia en profundidad, removiendo las partículas que obstruyen los folículos, disminuyendo la adhesión celular entre corneocitos, contribuyendo a la disminución de la seborrea del cuero cabelludo.

La intensa espuma actúa directamente en el cuero cabelludo, eliminando la acumulación de residuos y restaurando la humectación de la piel.

La fórmula se completa con Ictiol y Polidocanol.

Se recomienda utilizar de manera diaria o según recomendación médica.

#### Modo de Uso

- 1. Moie bien el cabello.
- 2. Coloque una cantidad adecuada de producto sobre el cuero cabelludo y masajee suavemente.
- 3. Deje actuar por lo menos durante unos minutos.
- 4. Enjuaque bien y repita si es necesario.

### Precauciones y Advertencias

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con los párpados y los ojos. Si esto ocurre, enjuagar con abundante agua. Suspender su uso si se observa una reacción desfavorable y consultar a su médico. Mantener alejado de los niños. No usar en niños menores a 3 años.

